

Basacote® Plus 9M 16-8-12(+2+TE)



Îngrășământ cu eliberare controlată

Îngrășământ complex NPK cu eliberare controlată, complet peliculat, cu disponibilitate optimă de macroelemente și oligoelemente pentru fertilizarea plantelor la ghiveci, a substraturilor, pentru top dressing (la suprafața substratului) și pentru fertilizarea directă în groapa de plantare.

- Eliberare îndelungată de până la 9 luni
- Înveliș 100% peliculat cu polimer W3 (polimer de etilenă acrilic) este elastic, rezistent la îngheț
- Tehnologia de eliberare adaptată la climă (CAR) este legată de temperatura ambientală și garantează disponibilitatea nutrienților în funcție de cerințele plantei
- Asigură aprovizionarea omogenă de macro și micronutrienți
- Risc minim de toxicitate a nutrienților și ardere a plantelor
- Formulare: granule ecranate de 2,5–3,5 mm pentru o distribuție uniformă în sol
- Conține cantități scăzute de clorură, mai puțină pierdere prin levigare și salinitate scăzută
- Sprijină formarea unor sisteme radiculare bine dezvoltate

Descriere

Basacote PLUS 9M este un îngrășământ complex NPK, granulat, complet peliculat, cu eliberare controlată timp de 9 luni, având o disponibilitate optimă de fosfor și oligoelemente pentru fertilizarea solului din ghivece, amestecuri de substrat, top-dress și fertilizarea directă în groapa de plantare. Învelișul peliculat nu afectează de proprietățile solului, cum ar fi pH-ul, activitatea microbiană sau salinitatea. Conține toți nutrienții necesari pentru creșterea sănătoasă a plantelor. Este de asemenea recomandat pentru culturi cu cicluri medii. Se utilizează cu frecvență de 1 aplicare pe an.

Se recomandă amestecarea în substrat direct înainte de utilizare (timp maxim de păstrare: 10 zile). Eliberarea controlată timp de 9 luni în condiții temperate și temperatură constantă de 21 °C.

Declarație

Îngrășământ EC

Fertilizant NPK, complet peliculat N-P₂O₅-K₂O(+MgO+S) 16-8-12 (+2+5), cu Bor, Cupru, Fier, Mangan, Zinc și Mobilden.

Pentru utilizare în horticultură.

Sărac în cloruri.

Valoare	Nutrienți	
16 %	N	Azot total, 7,4% azot nitric, 8,6% azotat de amoniu
8 %	P ₂ O ₅	Pentoxid de fosfor solubil citrat de amoniu, 5,6% Pentoxid de fosfor solubil în apă
12 %	K ₂ O	Oxid de potasiu solubil în apă
2 %	MgO	Oxid de magneziu total, 1,4 % Oxid de magneziu solubil în apă
5 %	S	Sulf total, 4% Sulf - solubil în apă
0,02 %	B	Bor
0,05 %	Cu	Cupru
0,4 %	Fe	Fier, 0,15% Fier chelat EDTA solubil în apă
0,06 %	Mn	Mangan
0,015 %	Mo	Mobilden
0,02 %	Zn	Zinc

Recomandări de utilizare

Pepiniere și plante ornamentale

Mod de aplicare

În amestec cu substrat sau la suprafață

Doza de aplicare

2-6 g/l sau kg/m³

Frecvența aplicării

1 aplicare pe an

Momentul aplicării

Urmați recomandarea regională

Silvicultură

Mod de aplicare

Fertilizarea gaurii de plantare

Doza de aplicare

10-300 g/plantă

Frecvența aplicării

1 aplicare pe an

Momentul aplicării

Urmați recomandarea regională

Ambalaj

sac de 25 kg

Recomandări de transport și depozitare

Transport

- Livrare sub formă de mărfuri vrac în saci mari sau pe paleți cu saci și găleți.
- Protejați produsul de umezeală în timpul transportului.
- Protejați produsul de lumina excesivă directă a soarelui și de fluctuațiile mari de temperatură în timpul transportului.
- Transportați îngrășământ doar la temperaturi moderate. Folosiți un camion cu aer condiționat dacă este necesar.
- Luați notă de orice etichetă de materiale periculoase de pe produs.
- Transportați și depozitați numai la temperaturi cuprinse între 5 °C și 40 °C. A se păstra numai în ambalajul original.
- Produsele trebuie epuizate cât mai repede posibil după deschidere.

Depozitare

- Protejați îngrășământul depozitat de îngheț, lumină și umiditate.
- Depozitați produsul în interiorul unei clădiri și nu în spații exterioare.
- Deoarece produsul are tendința de a atrage umezeala, protejați-l de ploaie și apă.
- Luați notă de etichetele materialelor periculoase de pe produs, acolo unde este cazul.
- Transportați și depozitați numai la temperaturi cuprinse între 5 °C și 40 °C. A se păstra numai în ambalajul original.
- Produsele trebuie epuizate cât mai repede posibil după deschidere.

Temperatura de depozitare

- Evitați înghețul și temperaturile excesiv de ridicate.
- Evitați fluctuațiile mari de temperatură în timpul depozitării.

Perioada de depozitare

- Atunci când este depozitat corect, îngrășământul (cu excepția îngrășământului lichid) poate fi depozitat în ambalajul original sigilat până la trei ani de la livrare.
- Produsele trebuie epuizate cât mai repede posibil după deschidere.