

BOUILLIE BORDELAISE WDG

FUNGICID

FUNGICID FOLIAR CU SPECTRU LARG PENTRU UTILIZAREA PE LEGUMELE CU BULBI ȘI TUBERCULI, CUCURBITACEE, VINETE, STRUGURI, LEGUMINOASE, FRUCTE SEMINȚOASE ȘI SÂMBUROASE, ROȘII

Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 2124/18.12.01
Certificat pentru utilizare în Agricultură Biologică
Conține: 200 g/kg cupru metalic (20% cupru metalic din 80% sulfat de cupru neutralizat)
UFI: 4NQ1-E9VM-R5SU-FKEN

Formulare: granule dispersabile în apă (WDG)
INFORMAȚII IMPORTANTE: PENTRU UTILIZARE DOAR CA FUNGICID
Culturi/situații: legume cu bulbi și tuberculi, cucurbitacee, struguri, leguminoase, fructe semințoase și sâmburoase, roșii.

CITIȚI ETICHETA ÎNAINTE DE UTILIZARE.
UTILIZAREA ACESTUI PRODUS NERESPECTÂND INDICAȚIILE DE PE ETICHETĂ POATE FI CONSIDERATĂ UN DELICT.
URMAȚI CODUL DE PRACTICĂ PENTRU UTILIZAREA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR.

FRAZE DE PERICOL:

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332 - Nociv în caz de inhalare.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P391 - Colectați scurgerile de produs.
P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPE3 - Pentru protecția organismelor acvatice ne-țintă respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață!

PENTRU A SE EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

Număr de telefon în caz de urgență: România 021/3183606 sau 02131836 20, Luni-Vineri, 8:00-15:00; Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr .Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 București.

PRODUCĂTOR:

CEREXAGRI S.A.S

Parc Saint Christophe, Pole Galilee 3 – Niveau 1 – 10, avenue de l'entreprise, 95863 Cergy Pontoise - Franța

DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII:

UPL EUROPE LTD

The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Regatul Unit

DISTRIBUITOR:

UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL

Str. Izvor 92-96, clădirea Forum III, et. 4, sector 5, București,
Tel.: +40 21 529 55 44, Fax: 021.529.55.45



Termen de valabilitate:
2 ani de la data fabricației
Lot nr./Data fabricației:
Vezi datele imprimate pe ambalaj

20 KG
AMBALAJ



ATENȚIE



PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

BOUILLIE BORDELAISE WDG se prezintă sub formă de granule autodispersabile de culoare albastră cu o masă omogenă și fără tendință de aglomerare.

INTERVALUL DE REINTRARE

Produsul este aplicat în general pentru boli foliare, iar intervalul de reintrare este de 21 - 28 de zile de la ultima aplicare.

MOD DE ACȚIUNE

Produsul acționează la contactul cu bolile foliare și agenții patogeni având un efect curativ și preventiv.

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT

Produsul este utilizat și aprobat pentru combaterea următorilor agenți patogeni:

CULTURA	AGENT DE DĂUNARE	DOZA
VIȚĂ DE VIE	Mana viței de vie (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,5% postfloral (5 kg/ha în 1000 l apă)
LIVEZI DE PRUNI	Pătarea roșie a frunzelor (<i>Polystigma rubrum</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Ciuruirea frunzelor (<i>Stigmina carpophila</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Putregaiul brun (<i>Monilia spp.</i>)	0,5% (5 kg/ha)
LIVEZI DE PIERSICI	Bășicarea frunzelor (<i>Taphrina deformans</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Ciuruirea frunzelor (<i>Stigmina carpophila</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Putregaiul brun (<i>Monilinia spp.</i>)	0,5% (5 kg/ha)
CIREȘI ȘI VIȘINI	Pătarea frunzelor (<i>Blumeriella jaapii</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Ciuruirea frunzelor (<i>Stigmina carpophila</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Putregaiul brun (<i>Monilinia spp.</i>)	0,5% (5 kg/ha)
PLANTAȚII DE MERI ȘI PERI	Rapănul (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Rapăn (<i>Venturia pirina</i>)	0,5% (5 kg/ha)
	Focul bacterian (<i>Erwinia amylovora</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
TOMATE	Mana târzie (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
	Mana timpurie (<i>Alternaria solani</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
	Pătarea și bășicarea frunzelor (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
	Pătarea pustulară (<i>Pseudomonas tomato</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
CASTRAVEȚI	Pătarea unghiulară a frunzelor (<i>Pseudomonas lacrymans</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
	Mana cucurbitaceelor (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
FASOLE	Mana comună (<i>Xanthomonas phaseoli</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
	Arsura aureolată (<i>Pseudomonas phaseolicola</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
CEAPĂ	Mana cepei (<i>Peronospora destructor</i>)	0,75% (7,5 kg/ha)
PLANTAȚII DE GUTUI	<i>Erwinia amylovora</i>	0,75% (7,5 kg/ha)

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. Produsul BOUILLIE BORDELAISE WDG nu trebuie omis din programele de combatere integrată. Produsul BOUILLIE BORDELAISE WDG trebuie aplicat în conformitate cu instrucțiunile și tehnologiile aprobate.

COMPATIBILITATE

Produsul BOUILLIE BORDELAISE WDG este compatibil cu majoritatea fungicidelor/insecticidelor utilizate în România. Pentru siguranță, efectuați un test de compatibilitate.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Evitați inhalarea sau contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului accidental cu produsul, se iau următoarele măsuri:

Inhalare: Transportați victima în aer liber.

Contact cu pielea: Spălați imediat cu apă din abundență și săpun.

Contact cu ochii: Spălați imediat cu apă din abundență. Dacă senzația de iritație persistă, consultați un specialist.

Ingerare: Dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul.

Instrucțiuni pentru medic: Se va trata simptomatic. Nu există niciun antidot specific.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, sigilat, într-o cameră uscată, rezervată exclusiv pentru pesticide, departe de lumina directă a soarelui sau căldură. Transportul trebuie efectuat astfel încât produsul să fie protejat de căldură și intemperii. Ambalajul original trebuie distrus după utilizare, neputând fi folosit în nici un alt scop.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

Ambalajele goale se colectează gratuit prin centrele de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea lor în alte scopuri. Sunați la tel. 0800.800.211 – apel telefonic gratuit sau consultați www.aiprom.ro pentru informații cu privire la cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de colectare SCAPA.

NOTĂ: Orice nerespectare a indicațiilor tehnice menționate mai sus duce la o eficacitate redusă sau un eșec total. Pentru clarificări suplimentare, contactați institutul, centrul de cercetare specializat din zonă sau compania de distribuție.